














<b>BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ</b>		<p>Rostlina pochází ze západního Kavkazu. Druhotně se rozšířil v západní a střední Evropě, Rusku a Severní Americe. Do České republiky byl zavlečen v roce 1862 v Lázních Kynžvart. V porostech bolševníku prakticky nerostou jiné rostliny. Rostlina obsahuje fotosenzibilní látky – furanokumariny, které pod vlivem slunečního záření způsobují na lidské kůži nepříjemné otoky a puchýře, jež se obtížně hojí.</p>
<b>NETÝKAVKA ŽLAZNATÁ</b>		<p>Jednoletá bylina, dosahuje výšky až 3 metry. Domovským areálem jsou Himaláje. Do Evropy byla přivezena v roce 1839 jako okrasná a nektarodárná bylina. První údaje z Čech jsou z roku 1846 z červeného Hrádku u Jirkova. Zralá semena vystřeluje až do vzdálenosti 4 metrů. Semena se šíří hlavně vodou a na peří ptáků, schopnost vyklíčit si uchovávají po dobu až 6 let.</p>
<b>NETÝKAVKA MALOKVĚTÁ</b>		<p>Původní na západě Himaláje a západní Sibiři, druhotně zavlečena do dalších částí Asie, velké části Evropy, severní Afriky a Severní Ameriky. V ČR rozšířena z botanických zahrad a parků v druhé polovině 19. století. V současnosti rozšířena na velké části ČR a místy vytváří rozsáhlé porosty.</p>
<b>KŘÍDLATKA JAPONSKÁ</b>		<p>Pochází z Dálného východu - z Koreje, Číny a Japonska. Do Evropy byla introdukována v roce 1825. Rychle se šíří a je jedním z našich nejznámějších invazních druhů. Rozmnožuje se vegetativně a „dálnicí“ šíření jsou hlavně vodní toky. Vytváří husté porosty, které vytlačují původní rostlinstvo.</p>
<b>KŘÍDLATKA SACHALINSKÁ</b>		<p>Pochází z ostrova Sachalin. Do Evropy byla introdukována v roce 1869. Je nejméně rozšířená a nejméně agresivní ze všech u nás zastoupených druhů daného rodu. Vytlačuje původní vegetaci.</p>

<p><b>KŘÍDLATKA ČESKÁ</b></p>		<p>Kříženec křídlatky japonské a křídlatky sachalinské, chová se ze všech druhů nejagresivněji.</p>
<p><b>TRNOVNÍK AKÁT</b></p>		<p>Pochází z východní části Sev.Ameriky. Kolem roku 1600 byl dovezen jako okrasný strom do pařížské botanické zahrady. Časem se lesníci přičinili o jeho rozšíření po celé Evropě. Ze spadaneho listí trnovníku jsou uvolňovány do půdy fenolkarboxylové kyseliny, které potlačují klíčení jiných rostlin, takže původní vegetace z blízkosti trnovníku brzy mizí a je nahrazována vegetací novou, zejména nitrofilními rostlinami jako jsou kopřivy apod.</p>
<p><b>PAJASAN ŽLAZNATÝ</b></p>		<p>Strom pochází ze severovýchodní a východní Číny a Koreje. V Austrálii, Severní a Střední Americe, střední a jižní Evropě a na Azorských ostrovech se chová invazně, proniká do travinných a skalních porostů, lesních světlin a rumišť. V ČR poprvé vysazen r. 1865 na Hluboké.</p>
<p><b>JAVOR JASANOLISTÝ</b></p>		<p>Pochází ze Severní Ameriky, k nám se dostal až v roce 1923 do Průhonice, kde roste nedaleko zámku dodnes. Jakožto rychle rostoucí dřevina velmi dobře regeneruje z kořenů i pařezů výmladky a uřezané větve snadno kořenují. Je to nezdolný plevel podél plotů a ve šterbinách chodníků</p>
<p><b>PCHÁČ ROLNÍ</b></p>		<p>Je velmi odolným a houževnatým plevem, ohrožujícím všechny kultury. Patří mezi velmi nebezpečné plevele. Konkurenční schopnost vysoká, má vysoké nároky na odběr vody a živin. V případě silného výskytu působí ztráty při sklizni kulturních rostlin, nebo sklizeň znemožňuje. Při silném výskytu dokáže úplně potlačit kulturní rostliny, vylučuje kořeny alelopatické látky, které působí inhibičně na kulturní rostliny a plevele.</p>



<p><b>TOPOL KANADSKÝ</b></p>		<p>Kříženec pravděpodobně vznikl v roce 1750 ve Francii. Nejstarší záznam z našeho území je z roku 1852 ze Sychrova. Invazivní dřevina pronikající do přirozených porostů vrbin na náplavech, údolních měkkých i tvrdých luhů, pobřežních porostů toků a vysokých mezofilních křovin. Problémem je nahrazování původního geneticky čistého topolu černého hybridními druhy.</p>
<p><b>BOROVICE VEJMUTOVKA</b></p>		<p>Jehličnatý strom pocházející z východní části Severní Ameriky. V místech svého optima vytlačuje místní borovici lesní (České Švýcarsko, Hradec Králové). Je klasickou kolonizující dřevinou, pod jejímž porostem (podobně jako u akátu) se zmlazuje většinou pouze ona sama – i díky opadu jehličí.</p>
<p><b>ZLATOBÝL KANADSKÝ</b></p>		<p>Pochází ze Severní Ameriky. Bývá často pěstovaný v zahradách a parcích, odkud také ve 2. polovině 19. století začal zplaňovat. Zdomácněl především na ruderalních místech a březích vod, a to na téměř celém území ČR.</p>